



برسيم

Egyption Clover

زمين:

برسيم جي پوک وارياسي کان چيڪي زمين ۾ ڪري سگهجي ٿي. هي فصل مختلف زمينن اندر پوکيو وڃي ٿو. جنهن ۾ وارياسي کان گريون لٽياسيون زمينون جنهن ۾ نيڪال سنو هجي اهي بهتر آهن. جڏهن ته برسيم جا ٻوٽا ڪلر وارين زمينن کي برداشت ڪن ٿا.

زمين جي تياري:

برسيم ڊگهي پاڙ وارو فصل آهي. جنهن لاءِ زمين جي تياري بهتر نموني ڪئي وڃي ٿي. هن فصل جي پوک لاءِ 3 کان 4 هر ڏئي پتر پيجي زمين کي هموار ڪجي. پاڻي ڏيڻ بعد بينل پاڻي ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪرڻ گهرجي.

پوکي جو وقت ۽ طريقو:

هن فصل جي پوک 15 سيپٽمبر کان 15 نومبر تائين ڪري سگهجي ٿي. جڏهن ته اهي علائقا جتي گرمي جو درجو وڌيڪ هجي ان حالت ۾ برسيم آڪٽوبر مهيني ۾ پوکيو وڃي ٿو. برسيم جي پوکي ڇت ذريعي ڪئي وڃي ٿي. هن فصل جي پوک لاءِ پهريائين زمين کي پاڻي ڏجي. ان بعد بينل پاڻيءَ ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪجي. هي فصل وونٽن ۽ مڪئي جي بينل فصل ۾ پوکيو وڃي ٿو. جنهن لاءِ آڪٽوبر جي مهيني ۾ وونٽن ۽ مڪئي کي پاڻي ڏجي ۽ بعد ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪجي. جڏهن ته ساريال جي علائقي ۾ برسيم جي پوک سارين جي فصل جي لٻاري بعد ڪئي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته هن علائقي جي زمين جي سڌاري واسطي سارين ۽ برسيم جي وارڻي ڪئي وڃي ٿي ته جيئن زمين مان ڪلر جو خاتمو ٿئي.

جنسون:

هن فصل لاءِ مقامي جنس پوکي وڃي ٿي. جنهن ۾ پنن ۽ رسدار ڏانڊين جو گهڻو مقدار ٿئي ٿو.

بچ جو مقدار:

هن فصل لاءِ 10 کان 12 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪجي. ڇاڪاڻ ته بچ سنهي هجڻ سبب ان جو مقدار وڌائي سگهجي ٿو.

پاڻ ڏيڻ:

هن فصل کي عام ڪري پاڻ نه ڏنو ويندو آهي. پر زمين اندر هڪ ٻئي پٺيان لڳاتار فصل پوکڻ سبب زمين جي زرخيزيءَ تي اثر پوي ٿو ۽ پيداوار گهٽ ملي ٿي. تنهنڪري زمين جي زرخيزي کي قائم رکڻ لاءِ پاڻ ڏيڻ ضروري آهي. هن فصل جي پوکيءَ لاءِ اڌ پوري يوريا ۽ ڏيڻ پوري ڊي-

اي-پي پاڻ في ايڪڙ پوکيءَ کان اڳ ڏيڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته فاسفورس پاڻ نه فقط فصل جي پيداوار وڌائي ٿو پر ان جي خاصيت تي پڻ سنو اثر ڏيکاري ٿو. جڏهن ته فصل جي پهرين لوب يا لابي بعد يوريا پاڻ جي اڌ پوري ڏيڻ گهرجي. جنهن سان فصل سائو ۽ سرسبز ٿيندو ۽ واڌ جلدي ٿيندي.

پاڻي ڏيڻ:

هن فصل جي پوکيءَ بعد ٻه هلڪا پاڻي هفتي اندر ڏيڻ گهرجن ته جيئن سنو ڦوٽهڙو ٿئي. ڇاڪاڻ ته جلدي پاڻي ڏيڻ سبب سلا جلدي ساوا ٿيندا ۽ واڌ تيز ڪندا. هن فصل ۾ مجموعي طور 8 کان 10 پاڻي ڏيڻ گهرجن. جيڪي 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان ڏيڻ گهرجن.

گندگاه:

هن فصل ۾ عام طور گڏ يا گندگاه ڪيڙ جي ضرورت نه آهي. پر هن فصل ۾ جيڪڏهن بصري، ڪاسي، سنجھ ۽ جهل نظر اچن ته هت ذريعي ڪڍي ڇڏجن.

برسيم جي ڪٽائي:

هن فصل جي پهرين ڪٽائي يا پهريون لوب هڪ مهيني جي اندر وٺڻ گهرجي ۽ سلسلي وار ڪٽائي ٻن يا ٽن هفتن بعد ڪندو رهجي. جڏهن ته آخري ڪٽائي بعد هن فصل کي ساڻي پاڻ لاءِ ڪم آڻي سگهجي ٿو.

پيداوار:

هن فصل مان 800 کان 1000 مٺ سائو چارو ملي ٿو. جڏهن ته بچ لاءِ پوکيل برسيم مان 8 کان 10 مٺ في ايڪڙ بچ ملي ٿو.

آءِ سي ٽي زرعي توسيعي مرڪز

ڊائريڪٽوريٽ جنرل زرعي توسيع، زراعت کاتو حڪومت سنڌ

ICT Agricultural Extension Services Center, Directorate General Agriculture Extension, Agriculture, Supply & Prices Department Government of Sindh, Block-F, Shahbaz Building Hyderabad.

Helpline: +92 3111646111 Email: ictagriextensionsindh@gmail.com

www.ictagrisindh.gov.pk