



ربيع جون ڀاڄيون Rabi Vegetables

ڪيميائي ڀاڻ لاءِ مشورو:

جيئن ته زمينون مختلف قسمن جون ٿين ٿيون. جهڙوڪ: وارياسيون، لٽياسيون، پڪيون، ڪلر وغيره واريون. ان ڪري هر قسم جي زمين لاءِ ڀاڻ مختلف قسم جو مختلف وزن ۾ ڏيڻو هوندو آهي جنهن لاءِ زمين جي مٽي ليبارٽريءَ مان چڪاس ڪرائڻي هوندي آهي ته جيئن پتو پوي ته زمين ڪهڙي قسم جي آهي. ۽ ان کي ڪهڙو ڀاڻ ۽ ڪيترو ڏيڻ گهرجي. ليبارٽريون زراعت کاتي حڪومت سنڌ پاران گهڻو ڪري هر ضلعي اندر قائم ٿيل آهي. جيڪي معمولي في وصول ڪرڻ سان مٽي چڪاس ڪري ڏين ٿيون. ڪافي جاين تي اهو ڏنو ويو آهي ته ڪلرانين ۽ پڪين زمينن ۾ به آبادگار ڊي-اي-پي ڀاڻ ڏين ٿا. جڏهن ته اهڙين زمينن ۾ ڊي-اي-پي ڀاڻ منع ٿيل آهي. جنهن جي جاءِ تي ايس-ايس-پي يا تي-ايس-پي وغيره ڏيڻو آهي. ان ڪري جتي ڀاڄيون پوکڻيون هجن اتي جي پهريان ليبارٽريءَ مان مٽي چڪاس ڪرائجي.

ڪيميائي ڀاڻ ڏيڻ جي لاءِ ان ڳالهه جو به خاص خيال رکجي ته ڀاڻ ڇڏي ڇڏي نه ڏجي پر ڀاڻ ڏئي مٿان هڪدم پاڻي ڏيڻ گهرجي.

ڪيميائي ڀاڻ ڪوشش ڪري پوئڻ جي پاڙن وٽ ڏيڻ گهرجي. سڄي زمين ۾ چٽڻ سان هڪ ته ڀاڄيءَ وارن پوئڻ کي ڀاڻ گهٽ ملي ٿو ۽ خالي زمين ۾ وڃي ڪري ٿو. جنهن جي ڪري ڀاڻ زيان به ٿئي ٿو ۽ زمين جي خالي جاين تي ڀاڻ پوڻ سان گندگاهه گهڻو زور وٺي وڃي ٿو.

زمين جي چونڊ ۽ تياريءَ لاءِ مشورو:

ڀاڄين جي پوکيءَ لاءِ ڪوشش ڪري نرم لٽياسِي زمين جي چونڊ ڪجي ته جيئن ڀاڄيون پليون ٿين. تياريءَ ۾ خاص طور تي زمين جي سنوت ۽ اونهن هرن ڏيڻ تي خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي. زمين جي سنوت لاءِ جيڪڏهن سهولت موجود هجي ته ليزر ليولنگ مشين استعمال ڪجي.

بج سيڪ تي هٽڻ جو مشورو:

بج جون چنگيون يا بيجاري جو روڻو ڪرين کي پهريان پاڻي ڏئي جتي سيڪ هجي اتي هٽڻ گهرجي. سيڪ تي پوکيل ڀاڄي جلد ٿئي ٿي ۽ تيار به تڪڙي ٿئي ٿي.

چيزل پلو هٽڻ جو مشورو:

عام طور تي زمين اندر سخت تهه جڙي پوي ٿو. جنهن جي ڪري پيداوار گهٽ لهي ٿي. ان ڪري سخت تهه کي ٽوڙڻ لاءِ ضروري آهي ته هر ٽئين سال زمين ۾ چيزل پلو ضرور هٽڻ گهرجي. چيزل پلو هٽڻ سان نه صرف زمين اندر جڙيل سخت تهه ٽٽي پوي ٿو پر ساڳئي وقت چيزل پلو جي اها به خاصيت آهي ته اهو زمين اندر راجا ۽ ڊسڪ پلو کان گهڻو اونهو به وڃي ٿو ۽ زمين کي اتلائي به بلڪل نٿو ۽ زمين جو مٿيون طاقت وارو تهه به پنهنجي جاءِ تي برقرار رهي ٿو.

وٽاڻ جي پاڻ ڏيڻ جو مشورو:

سنڌ جي زمينن ۾ هڪ سيڪڙو کان به نامياتي مادو گهٽ آهي. جيڪو زمينن مان سٺي پيداوار کڻڻ لاءِ بلڪل ناڪافي آهي جنهن کي وڌائڻ لاءِ ضروري آهي ته زمينن کي هر ٽئين سال وٽاڻ جو ڳريل سٽيل پاڻ ضرور ڏيڻ گهرجي. وٽاڻ جو پاڻ ڇاڇين پوکڻ کان پهرين زمين ۾ 150 کان 200 مٺ في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي. پاڻ ڏيڻ وقت ان جي ڳريل سٽيل هجڻ جي پڪ ضرور ڪرڻ گهرجي. فصل ۾ تازو وٽاڻ جو پاڻ هرگز نه وجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هڪ طرف وٽاڻ جي تازي پاڻ ۾ زمين کي سڌارڻ واري گهربل طاقت ناهي هوندي ۽ ٻئي طرف ان ۾ گندگاهه جا بچ موجود هوندا آهن. ان کان علاوه ڪچو پاڻ زمين ۾ وجهي ڇاڇيون پوکڻ سان ڇاڇين کي اڏوهي لڳي ٿي ۽ ڇاڇين جي فصل ۾ نقصان ٿئي ٿو. وٽاڻ جو پاڻ ڇاڇيون پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين زمين ۾ وجهي هڪدم هرن ذريعي ملائي مٿان پاڻي ڏيڻ گهرجي. پاڻي ڏيڻ کان پوءِ جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي وري ريڇ ڪجي ۽ ٻيهر جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي زمين کي تيار ڪجي.

ڇاڇين ۾ پاڻ ۽ پاڻي جي استعمال لاءِ مشورا:

1. پاڻ هميشه ماک سڪڻ کان پوءِ پر ٿڌ واري وقت تي ڏجي.
2. پاڻ اهڙي طرح سان ڏجي جيئن پاڻ ڇاڇي ۽ جي پاڙن جي ڀر ۾ ڪري.
3. پاڻ ڏيڻ کانپوءِ پاڻي ڏيڻ ۾ دير هرگز نه ڪجي بلڪه هڪدم پاڻي ڏجي.
4. بچيل پاڻ کي کليل ۽ گهر واري حالت ۾ نه رکجي پر چڱي طرح ٻڏي يا دٻي ۾ بند ڪري خشڪ جاءِ تي رکجي.
5. پاڻي ڇاڇين کي گهڻو هرگز نه ڏجي ۽ خاص طور تي ڪرين تي پوکيل ڇاڇين ۾ پاڻي اهڙي طرح ڏجي جيئن چنڪين يا لڳل ٻوٽن تائين صرف سيڪ ٻهڃي ڀر اهي پاڻي ۽ هر هرگز نه ٻڏن، ڇاڪاڻ ته سيڪ واري ڇاڇي تمام گهڻي سٺي ٿئي ٿي.
6. سڀني ڇاڇين کي پوکي کان پوءِ به تي پاڻي تڪڙا تڪڙا ڏيڻ گهرجن.
7. هر ڇاڇي کي ٻڌايل پاڻي جي وقفي کان علاوه موسم ۽ فصل جي حالت کي به نظر ۾ رکجي.

بيجارو پوکڻ لاءِ مشورو:

بيجارو رستي پوکجندڙ ڇاڇين جهڙوڪ: مرچن، واڱڻن، بصرن، گوبي تمانن وغيره جي بيجاري تيار ڪرڻ لاءِ هيٺئين طريقي کي اختيار ڪجي:

بيجارو ڊگهين اڀين پٽڙين جي شڪل وارين ٻارين ۾ پوکجي. اهڙين ٻارين ۾ لت واري مٽي وجهي زمين جي سطح کان مٿي ڪري وچ مان اهڙي طرح ناليون ڪڍجن ته جيئن جيڪڏهن پاڻي ڪنهن به سبب جي ڪري گهڻو ٿي وڃي ته اهو نالين ۾ وهي وڃي. ۽ بيجارو گهڻي پاڻي جي ڪري سڙي نه. ان کان پوءِ ڪڪ پن ۽ ٻيو گند ڪچرو ساڙي خاڪ تيار ڪجي اها چار (خاڪ) جڏهن نري وڃي ته جنهن به ڇاڇي جو بيجارو پوکڻو هجي ان جو بچ لت واري مٽيءَ تي چٽي مٿان خاڪ ايتري وجهجي جيئن بچ چڱي طرح ڍڪجي وڃي. ۽ ڍڪيل بچ کي هٿ واري قوهاري سان پاڻي جو قوهارو ڪري مٿان ڪڪن يا سارين جي پلال سان ڍڪي ڇڏجي. جنهن بعد روزانو ڪڪن جي مٿان هٿ واري قوهاري سان تيسنائين پاڻيءَ جو قوهارو ڪجي جيستائين بچ مڪمل

قتي وڃي. جنهن بعد پاڻيءَ جو ٻئي ٽئين ڏينهن ڦوهارو ڪبو رهجي ۽ جڏهن بيجارو وڌو ٿي وڃي ته ڪڪ ڪانا هٽائي ڇڏجن.

ربيع جي پاڇين جون فصلوار سفارشون

مٿر (Peas):

پوکيءَ جو وقت: آڪٽوبر کان نومبر.

جنسون: پرلي، سونڪس، پي ايف 400، شيرين.

بج جو مقدار: 15 کان 20 ڪلو گرام.



پوکيءَ جو طريقو: ننڍي قد وارين جنسن جون چئن فوٽن جي ويڪرن

ڪرين تي اڍائي کان ٽن انچن جي مفاصلي تي چنگيون هڻجن.

وڏي قد ۽ وچولي قد وارين جنسن جون چئن فوٽن جي ويڪرن ڪرين

تي ٻن کان ٽن انچن جي مفاصلي تي چنگين ذريعي پوکجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ ٻوري، يوريا هڪ ٻوري ۽

پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ يوريا هر پنڊرين

ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17:17:17) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ. هڪ ٻوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت

ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري

يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: هفتي هفتي ضرورت مطابق ڏجي.

ٽماٽا (Tomato):

پوکيءَ جو وقت: بيجارو جون کان جولاءِ يا آگسٽ ۾ پوکجي رونبو آگسٽ کان سيپٽمبر تائين

ڪجي.

جنسون: روما، ايس آر ٽوٽي 10 وڪٽري لانگ سپر ميني ميڪر، مارگلوب، گرنتا، رٽگرس وغيره.

بج جو مقدار: 200 کان 250 گرام في ايڪڙ.



پوکيءَ جو طريقو: 6 کان 8 فوٽن جي ويڪرن ڪرين تي هڪ کان ٻن

فوٽن جي مفاصلي تي رونبو ڪجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ ٻوري، يوريا هڪ ٻوري ۽

پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا

هڪ يوريا هر پنڊرين ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17:17:17) جون 3

ٻوريون في ايڪڙ. هڪ ٻوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا

پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: هفتي هفتي ضرورت مطابق ڏجي.



پٽاٽا (Potato):

پوکيءَ جو وقت: آڪٽوبر کان نومبر

جنسون: اڇا پٽاٽا، ملتا ۽ پيٽرونس

بج جو مقدار: 15 کان 20 مڻ في ايڪڙ.

پوکيءَ جو طريقو: 2 کان اڍائي فوٽن جي ڪرين جي چوٽيءَ تي، 5

کان 6 انچن جي مفاصلي تي لڳائجن.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ پوري، يوريا هڪ پوري ۽

پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه پيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر

پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين-پي-ڪي

پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-

ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: پوريون پوکيءَ وقت هڪدم ڏجي باقي هفتي ڏهين ڏينهن ضرورت مطابق ايترو ڏجي جنهن

جو چوٽيءَ تي صرف سيڪ پهچي.



پٽائي گجرون (Carrot):

پوکيءَ جو وقت: آڳاٽي پوک سيپٽمبر کان آڪٽوبر

مندائتي پوکي: نومبر

جنسون ۽ بج جو مقدار: ڊيسي 5 کان 6 ڪلو ۽ ولاٽي 3 کان 4

ڪلو گرام في ايڪڙ.

مفاصلو: بوتان چئن انچن جا ٽين ته 13 انچن جي مفاصلي تي ڇڏائي ڪجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ پوري يوريا هڪ پوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في

ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه پيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي

(17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي

۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ

مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: آڳاٽي فصل کي پهريان تي چار پاڻي هر هفتي بعد ۽ تڏين ۾ ڏهين کان ٻارهين ڏينهن بعد

پاڻي ڏجي.



بصر (Onion):

پوکيءَ جو وقت: آڳاٽي فصل لاءِ بيجارو جولاءِ کان آگسٽ

تائين لڳائجي ۽ رونيو آگسٽ کان سيپٽمبر ۾ ڪجي ۽

پاڇائي پوکي جنوري تائين ڪري سگهجي ٿي.

جنسون: هزار، ڦلڪارا، ٿاڻو بولا خان، نصرپوري، گهوٽڪي ۽ ڊيسي وغيره.

بج جو مقدار: ڪڏ به کان اڍائي ڪلو گرام في ايڪڙ.

پوکيءَ جو طريقو: ٻه کان اڍائي فوٽن جي مفاصلي وارن ڪرين جي ٻنهي پاسي ٻن کان ٽن انچن

جي مفاصلي تي بيجارو رونبو ڪجي.
 ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ پوري، يوريا هڪ پوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في
 ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي
 (17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين پي ڪي پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي
 ۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ مهيني
 بعد ڏجي.

پاڻي: شروعاتي 3 پاڻي هفتي هفتي بعد پوءِ ڏهين کان ٻارهين ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.
 گڏ ۽ مٽي چاڙهڻ: گندگاهه جيئن نظر اچي ته گڏ ڪري گندگاهه جي صفائي ڪجي ۽ ٻوٽن تي ٻه
 ڀيرا مٽي چاڙهجي.



ٿورم (GARLIC):

پوکيءَ جو وقت: اڳاٽي پوکي سيپٽمبر کان شروع ڪجي ۽
 ختم نومبر جي آخر ۾ ڪجي.
 جنسون: ديسي نيو دمبالو.
 بچ جو مقدار: 100 ڪلوگرام في ايڪڙ.
 پوکيءَ جو طريقو: ننڍين ٻارين ۾ اڌ فوت جي مفاصلي تي
 قطارن ۾ ٽن ٽن انچن جي مفاصلي تي ڳڙيون رونبو ڪجن. جڏهن ته ڪرين تي به پوکي ڪري
 سگهجي ٿي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ڏيڍ پوري، يوريا هڪ پوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في
 ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي
 (17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي
 ۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ مهيني
 بعد ڏجي.

پاڻي: شروعاتي ٻه ٽي پاڻي تڪڙا ڏجن ته جيئن ڳڙيون ڦٽن. جنهن بعد گرميءَ ۾ اين-پي-ڪي
 هفتي هفتي بعد ۽ سرديءَ ۾ ڏهين کان ٻارهين ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.



پالڪ (SPINACH/ CHARD):

پوکيءَ جو وقت: ديسي پالڪ آڪٽوبر کان جنوريءَ تائين
 پوکجي پر ولايتي پالڪ ان سان گڏ سانوڻيءَ ۾ پوکي وڃي
 ٿي.
 جنسون: ديسي پالڪ نرم ۽ سنهن پنن واري ۽ ولايتي پالڪ
 سخت ۽ وڏن پنن واري.

بچ جو مقدار: 15 کان 20 ڪلوگرام في ايڪڙ
 پوکيءَ جو طريقو: ننڍين ٻارين ۾ قطارن جي شڪل ۾ پوکجي پر ساڳئي وقت ننڍن ڪرين تي
 پوکي سگهجي ٿي.

ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري. ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد، ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ وجهجي.
پاڻي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ تڏ ۾ ٻارهين کان پندرهن ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.



بند گوبي (CABBAGE):

پوکيءَ جو وقت: مندائتي پوکي لاءِ بيجارو سيپٽمبر-آڪٽوبر ۾ ۽ رونبو آڪٽوبر- نومبر ۾ ڪجي. جڏهن ته پاڇائي پوکيءَ لاءِ بيجارو نومبر ۾ ۽ رونبو ڊسمبر ۾ ڪجي.
بج جو مقدار: 100 کان 400 گرام في ايڪڙ.
ڪيميائي پاڻ: اين-پي-ڪي هڪ کان ڏيڍ ٻوري ۽ پوناش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ ٻوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17.17.17) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ. هڪ ٻوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.
گڏ ۽ پاڻي: گڏ جڏهن رونبي کان پوءِ ٻوٽا چڱي طرح لڳي وڃن ته ڪجي ۽ ٻوٽن تي هلڪي مٽي چاڙهجي. اهڙي طرح پندرهن ڏينهن ٻي گڏ ڪري وري مٽي چاڙهجي پاڻي شروع ۾ ٻه ٽي ٽڪڙا ڏجن. ان بعد سردِي ۾ ڏهين کان پندرهن ڏينهن ۽ گرمي ۾ هر هفتي پاڻي ۾ پاڻي ڏجي.

هر ٻو (FENUGREEK):



پوکيءَ جو وقت: مندائتي پوکي سيپٽمبر کان نومبر تائين پر جنوريءَ تائين لڳائي سگهجي ٿو.
جنسون: ڊيسي ۽ قصوري
بج جو مقدار: 6 کان 8 ڪلو گرام في ايڪڙ
پوکيءَ جو طريقو: ننڍيون چورس ٻاريون ٺاهي، انهن ۾ ريڇ ڪري مٿان پاڻيءَ ۾ بج چٽي ڇڏجي.
ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ. ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏجي.
پاڻي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ تڏ ۾ ٻارهين کان پندرهن ڏينهن بعد پاڻي ڏيڻ گهرجي.

سلاد (LETTUCE):



پوکيءَ جو وقت: سيپٽمبر کان نومبر تائين
پوکيءَ جو طريقو: ٻن کان اڍائي فوٽن جا ڪريا ڪڍي ڪرين جي ٻنهي پاسي 9 انچن جي مفاصلي تي چنگيون هڻي ڪرين ڪي ايترو پاڻي ڏجي جيئن چنگين تائين صرف پاڻيءَ جو سيڪ پهچي.

ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ. ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏجي.

پاڻي: گرميءَ ۾ هفتي هفتي بعد ۽ سرديءَ ۾ ٻارهين کان پنڊرهين ڏينهن بعد پاڻي ڏجي.

ڌاڻا (CORIANDER):



پوکيءَ جو وقت: مندائتي پوک سيپٽمبر کان آڪٽوبر تائين تجويز ٿيل آهي. باقي سڄو سال پوکجن ٿا. جنسون: ايراني ۽ ديسي.

بج جو مقدار: 6 کان 8 ڪلو گرام في ايڪڙ

پوکيءَ جو طريقو: ٻن اڍائين فوٽن جي ڪرين تي ٻنهي پاسن کان ليڪ ڪڍي ان ۾ بج چٽي. مٿان هٿ سان ڍڪي. سيڪ جيترو پاڻي ڏجي. اهڙي طرح ناڙي به ڪري سگهجي ٿي. بج کي سڄي رات ٻُڙائي رکجي ۽ پوءِ پوکجي.

ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ. ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏجي.

پاڻي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ سرديءَ ۾ ٻارهين کان پنڊرهين ڏينهن بعد پاڻي ڏيڻ گهرجي.



سوڻف (وڌق) (FENNEL):

پوکيءَ جو وقت: 15 آڪٽوبر کان نومبر جو سڄو مهينو بج جو مقدار: 5 ڪلو گرام في ايڪڙ

پوکيءَ جو طريقو: ڏيڍ کان ٻن فوٽن جي مفاصلي تي قطارن ۾ پوکجي.

ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ ۽ ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: پهريون پاڻي مهيني بعد ۽ ٻيا پاڻي پنڊرهين کان ويهين ڏينهن بعد ڏجن.



ڦوڏنو (MINT):

پوکيءَ جو وقت: نومبر کان ڊسمبر ۽ فيبروري کان مارچ.

بج جو مقدار: ڦوڏنو پراڻي پوکيل فصل جون پاڙون ڪڍي پوکجي. ان لاءِ چاليهه هزار کان پنجاهه هزار پاڙون پوکجن.

پوکيءَ جو طريقو: ڪرين تي ۽ قطارن ۾ پوکي سگهجي ٿو.

مفاصلو: ڪريا ڏيڍ فوٽ جا هجن ۽ قطارون هڪ فوٽ تي ڪري پوکجن ۽ ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو 6 انچ رکجي.

ڪيميائي پاڻ: پوکي ۽ وقت اين-پي-ڪي هڪ ٻوري في ايڪڙ ۽ بعد ۾ هر لوب کان پوءِ يوريا هڪ ٻوري في ايڪڙ ڏجي.

پاڻي: شروعات ۾ ٻه ٽي پاڻي تڪڙا ۽ بعد ۾ هر هفتي بعد فصل جي گهرج مطابق ڏجن.

پاڇين جا جيت، بيماريون ۽ آءِ پي ايم

پاڇين ۾ ٻن قسمن جا جيت ٿين ٿا. هڪڙا نقصانڪار جيت جيڪي پاڇين کي نقصان رسائڻ ٿا ۽ ٻيا فائديمند جيت ٿين ٿا. جيڪي پاڇين کي پنهنجي خوراڪ نٿا بڻائڻ پر اهي نقصانڪار جيتن کي کائي پنهنجو پيٽ ڀرين ٿا. ۽ پاڇين کي نقصانڪار جيتن جي نقصان کان بچائڻ ٿا. اهڙن فائديمند جيتن ۾ ننڍڻيون، پنيوريون، ڏينپو، ڪوريٽڙو وغيره اچي وڃن ٿا.

فائديمند جيتن جي پاڇين ۾ گهڻي تعداد ۾ هئڻ جي صورت ۾ نقصانڪار جيتن جو تعداد گهڻو نٿو وڌي ۽ پيسٽيسائيڊس جي هروڀرو قوهارن جي ضرورت پيش نٿي اچي پر اڻڄاڻائي ۽ تڪڙي فائدي وٺڻ جي چڪر ۾ پاڇين جا باغبان پاڇي پوکڻ کان پوءِ جيئن ئي هڪ اڌ نقصانڪار جيت ڏسڻ ٿا ته هڪدم پيسٽيسائيڊ يعني زرعي زهر جو قوهارو شروع ڪري ڏين ٿا. جنهن سان نقصانڪار جيتن سان گڏ فائديمند جيت مري وڃن ٿا ۽ قوهاري جو اثر ختم ٿي مس ٿو ٿئي ته هڪدم ٻيا نقصانڪار جيت ظاهر ٿي پون ٿا.

پاڇين ۾ نقصانڪار جيت عام طور تي ٻن قسمن جا ٿين ٿا. هڪڙا رس چوسڻ وارا جهڙوڪ: اچي مک، ساڻو مهلو، سست مهلو، ٿرڙو وغيره.

اهڙي طرح ٻيا وري پاڇين کي کائڻ وارا جيت جهڙوڪ: آمريڪي ڪينئون، ٽڏيون، لشڪري ڪينئون وغيره اچي وڃن ٿا.

هنن ٻنهي قسمن جي جيتن مان رس چوسڻ وارا جيت پاڇين تي شروع ۾ ئي پاڇيون جڏهن گهڻيون سايون ۽ نرم هجن ٿيون تڏهن حملي آور ٿين ٿا. جڏهن ته پاڇين کي، کائڻ وارا جيت بعد ۾ آهستي آهستي اچن ٿا ۽ پوءِ گهڻو ڪري ٻنهي قسمن جا جيت موجود هجن ٿا ساڳئي وقت پاڇين تي ڪيترن ئي قسمن جون بيماريون پڻ حملو ڪن ٿيون.

هنن نقصانڪارن کي زرعي سائنسدان ”جيتن ۽ بيمارين جي ضابطي واري گڏيل حڪمت عملي، يعني آءِ پي ايم (IPM) واري طريقي سان ضابطي ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ ان جون ئي حڪمت عمليون ٻڌائڻ ٿا.

پاڇين لاءِ آءِ پي ايم:

فصلن (پاڇين) جي نقصانڪار جيتن جي ضابطي ۽ واري گڏيل حڪمت عملي يعني آءِ پي ايم (IPM) هڪ اهڙي مؤثر ۽ ماحول دوست سوچ آهي. جنهن ۾ ڪيميائي زهرن يعني پيسٽيسائيڊس کي آخري هٿيار طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته ان کان پهرين ٻين طريقن سان نقصانڪار جيتن جي نقصان کان بچي سگهجي ٿو. آءِ پي ايم جي سوچ ۾ بنيادي اهميت ان ڳالهه کي ڏني وڃي ٿي ته جيت بيماريون يا گندگهه اسان جي فصلن پاڇين وغيره ۾ آخر شدت اختيار ڇو ٿا ڪن؟ شدت ڪيئن ٿا اختيار ڪن ۽ ڪڏهن ٿا ڪن؟ ۽ انهن جي شدت کي گهٽائڻ جا غير ڪيميائي طريقا ڪهڙا آهن؟ وغيره.

آءِ پي اير جا چار مُڪيه اصول طءُ تيل آهن:

1. صحتمند فصل اپائڻ (Grow Healthy Crop).
2. فصل کي روزانو چڱي طرح گهمي ڏسن ته جيئن ڪو به مسئلو ظاهر ٿيڻ شرط شروع ۾ ئي ان کي حل ڪري ڇڏجي.
3. دوست جيتن کي بچائڻ (Conserve Natural Enemies) جيئن ته فصلن ۾ نقصانڪار جيتن سان گڏ فائديمند جيت يعني اهي جيت جيڪي فصل کي نٿا کائڻ پر نقصانڪار جيتن کي پنهنجي خوراڪ بڻائڻ ٿا انهن کي بچائجي.
4. آبادگار خد ماهر ٿي وڃي (Farmer Becomes Expert) آبادگار هر وقت ٻين تي نه پاڙي پر خد ايتري ڄاڻ حاصل ڪري جو هو خد ماهر ٿي وڃي.

عملي طور تي پاجين جي آءِ پي اير ۾ هيٺين عملن تي زور ڀريو وڃي:

1. پاجين ۾ گندگهه کي هرگز وڌڻ نه ڏجي، ڇاڪاڻ ته گندگهه جي اندر جيت جڻيا وڌيڪ شدت اختيار ڪن ٿا ۽ ساڳئي وقت پاجين جي خوراڪ کڻي انهن کي ڪمزور به ڪن ٿا.
2. نائٽروجن وارو پاڻ گهڻو نه ڏجي گهڻو پاڻ ڏيڻ سان پاجيون ڪڇ ۽ ساوڪ وڌيڪ ڪن ٿيون جنهن جي ڪري جيتن جو حملو وڌي ٿو.
3. بيمار بچ يا بيجارو هرگز نه پوکجي ۽ شروعات ۾ غير ڪيميائي طريقن کي اختيار ڪرڻ گهرجي.
4. پاجين جي روزانو جاچ ڪبي رهجي.
5. زرعي زهرن جو شروعات ۾ تڪڙو قوهارو ڪرڻ کان پاسو ڪجي.

جيتن ۽ بيمارين جو غير ڪيميائي ضابطو:

1. ڪششي ٻوٽا پوکڻ:

واڙيءَ جي چوڌاري سورج مُڪي، مڪئي، يا جوئر جي قطار ضرور پوکجي، جن ۾ جڏهن بچ ايندو ته ان بچ تي پڪي ايندا جيڪي ان بچ کي کائڻ سان گڏ پاجيءَ ۾ موجود نقصانڪار ڪيٽنن کي به کائي ناس ڪندا.

2. باجهر جي اُن جو استعمال:

جيڪڏهن پاجيءَ ۾ ڪيٽن جو حملو گهڻو هجي ته ٻن سان باجهريءَ جي اُن جي لُپ ڇڻي وڃي ته ان تي پڪي ايندا جيڪي باجهريءَ جي اُن کي کائڻ سان گڏ ڪيٽن جو به خاتمو آڻي ڇڏيندا.

3. سرف ۽ پاڻيءَ جو قوهارو:

جيڪڏهن پاجيءَ ۾ رس چوسڻ وارا جيت هجن ۽ پنن تي مٽي يا سڻپ يا ڪاري ماڪيءَ جهڙي حالت هجي ته هڪ چمچو سرف جي پاڻودر جو ڪلهي واري قوهاري جي ڊبي ۾ وجهي قوهارو ڪجي ته ڪافي حد تائين تدارڪ ٿي ويندو.

4. نم جو استعمال:

نقصانڪار جيئن جي نقصان کان پاڇين کي بچائڻ ۽ ماحولياتي گدلاڻ کان بچڻ لاءِ نم بهترين ذريعو آهي. عام طور تي ڏنو اهو ويو آهي ته پاڇين تي ڪيميائي زهرن جو بي حساب استعمال ٿئي ٿو. جنهن تي نه صرف خرچ گهڻو ٿئي ٿو پر مختلف رپورٽن مان ظاهر ٿيو آهي ته اهڙين پاڇين ۾ زرعي زهرن جو اثر رهجي وڃي ٿو. جيڪو پاڇيون واپرائيندڙن جي صحت کي نقصان رسائي ٿو. ان ڪري آءِ پي ايم جي استعمال کي وڏي اهميت ڏني وڃي ٿي.

نم جي پنن جو ڳار:

نم جي ڏھ (10) ڪلو گرام کن ساون پنن کي ڪنهن ڊرم ۾ وجهي ايترو پاڻي ڀرجي جيئن پن چڱي ريت ٽُسي وڃن. جنهن بعد انهن کي باهه تي ڪاڙهجي ۽ ايتري تائين ڪاڙهجي جيئن پاڻي سُڪي هڪ لٽر وڃي بچي. بچيل هڪ لٽر ڳار کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي ڪنهن بوتل ۾ وجهي رکجي. جڏهن جيئن جو حملو نظر اچي ته ان وقت 100 ملي لٽر ڪلهي واري قوھاري جي ڊبي ۾ وجهي قوھارو ڪجي ۽ وري انين ڏينهن ٻيو قوھارو ڪجي. نم جي ڳار جو قوھارو ڪرڻ سان جيتوڻيڪ جيت مرندا ڪو نه پر اهي واڙيءَ مان پڇي ويندا ۽ ٻاهران وري ٻيا نقصانڪار جيت واڙيءَ ۾ داخل نه ٿيندا.

نم جي تيل جو استعمال:

نم جون نموريون وڻ مان جيئن ڪرن ته انهن کي ميڙي چانو ۾ سڪائڻ لاءِ رکجي ۽ نموريون جڏهن بلڪل سُڪي وڃن ته انهن کي گهاٽي تان پيڙائي، تيل ڪيرائي رکي ڇڏجي. جڏهن واڙيءَ ۾ جيئن جو معمولي حملو نظر اچي ته هڪدم 100 ملي لٽر نمورين جو تيل ڪلهي واري قوھاري جي ڊبي ۾ وجهي هڪ چمچو سرف جي پاڻوڊر جو ملائي، چڱي طرح گڏائجي پوءِ واڙيءَ ۾ قوھارو ڪجي ۽ اهو قوھارو انين ڏينهن وري ورجائجي ته جيئن تي ضابطو اچي ويندو.

نم جي کڙ جو استعمال:

نمورين مان تيل ڪيرائڻ کان پوءِ جيڪو کڙ بچي ٿو ان جا 5 ڪلو گرام 5 لٽر تهڪندڙ پاڻيءَ ۾ وجهي 2 چمچا سرف جي پاڻوڊر جا وجهي چڱيءَ طرح ملائي ڍڪ ڏئي 24 ڪلاڪن تائين رکي ڇڏجي. جنهن بعد ان کي هٿن سان مهتي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي هڪ سؤ لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي واڙيءَ تي قوھارو ڪجي.

نمورين جي پاڻوڊر جو استعمال:

سڪل نمورين کي پاڻيءَ ۾ تيستائين ڀُستائجي جيستائين نمورين جون ڪلون نرم ٿي وڃن جنهن بعد نمورين جون ڪلون لاهي گورن کي چانو ۾ سڪڻ لاءِ رکجي، جڏهن گورا سڪي وڃن ته انهن کي پينهين يا ڪُٺي پاڻوڊر ٺاهجي. پاڻوڊر جي 3 ڪلو گرام وزن کي 24 ڪلاڪ ڀُستائي رکجي جنهن بعد ان کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي هڪ سؤ لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي 8 کان 10 چمچا سرف وجهي قوھارو ڪجي.

ٿورم جو قوھارو:

هڪ ڪلو ڪٽيل ٿور 20 ڇانهن وارا ڇما (100 گرام) سرف يا صابڻ، 20 ڇانهن وارا ڇمڇا ۽ هڪ ليٽر گاسليٽ ۽ 5 لٽر پاڻي جو ڳار ٺاهيو جنهن لاءِ ٿور گاسليٽ ۾ 24 ڪلاڪ پسائي رکجي. ان کان پوءِ ان ۾ سرف يا صابڻ ۽ پاڻي وجهي چڱي طرح هلائي هلائي ڇاڻجي ڇاڻيل ڳار مان هڪ حصو ۽ 20 حصا پاڻي ملائي پاڇين تي ڦوهارو ڪجي ته جيت ضابطي ۾ رهندا.

تماڪ جو ڳار:

هڪ سؤ پنجاهه گرام تماڪ جي پنن کي ننڍا ننڍا ٽڪر ڪري هڪ لٽر تهڪندڙ پاڻيءَ ۾ وجهي ٻه چار تهڪا ڏئي چلهي تان لاهي 12 ڪلاڪن لاءِ رکو. ٻارنهن ڪلاڪن کان پوءِ هٿ سان چڱي طرح مهتي ڪنهن سنهي ممل جي ڪپڙي ۾ ڇاڻي پاڻي صاف بوتل ۾ وجهي رکو. جڏهن پاڇين ۾ مهلو، اڇي مک، جُون پن ڪٽرڻ وارا ڪينٽان نظر اچن ته هڪ حصو تماڪ جي ڳار جو ۽ 10 حصا پاڻيءَ جا پاڻ ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو.

ڦوڏني جو ڦوهارو:

ڦوڏني جي هڪ ڪلو گرام پنن کي گهوتي هڪ سؤ لٽر پاڻيءَ ۾ چڱيءَ طرح ملائي پاڇين تي ڦوهارو ڪريو ته پنن تي داغن وارين بيمارين کان بچاءُ ۾ مدد ملندي. ڦوهاري لاءِ حجامن جي دڪانن تي استعمال ٿيندڙ هٿ وارو ڦوهارو استعمال ڪجي.

مال جي ڇيڻن جو ڦوهارو:

اڌ ڪلو گرام مال جا تازا ڇيڻا 5 لٽر پاڻيءَ ۾ وجهي چڱيءَ طرح گڏائي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي جراثيمي بيمارين جي ضابطي لاءِ پاڇين تي ڦوهارو ڪريو.


چور ڪينٽون ۽ پتاتا:




چور ڪينٽون تمان، مرچن ۽ شمل مرچن کي ڏاڍو نقصان ڏئي ٿو. هي جيت رات جو نڪري بيجاري جي ڏانڊين کي ٽڪي ٿو. ان لاءِ بيجاري ۾ رات جي وقت پتائن جا وڏا ڳترا ڪري پنن جي ويجهو رکي ڇڏجن، صبح جو اڇي ڏسو ته انهن ڳترن تي ڪينٽان موجود هوندا جن کي هٿن سان ناس ڪجي.







ربيع جي پاڇين جا جيت، بيماريون ۽ ڪيميائي ضابطو

پاڇي	جيت	پيٽيسائيڊ	وزن في ايڪڙ
تماتا	اڇي مک، سائو مهلو، سست مهلو	ڪونفيڊور يا اميدا	250 ملي لٽر
		پولو يا ڍولو يا سولو يا ڊائفيٽيوران	200 ملي لٽر
	اڇي مک، گهڻي تعداد ۾ هجي ته	موسپيلان يا ايسيلان يا پاڻڙي پروڪسيفن	125 گرام 400 ملي لٽر
	آمريڪي ڪينٽون، ميوي جو ڪينٽون، لشڪري ڪينٽون	پروڪليمر يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون	200 ملي لٽر
		ميچ يا ڍرون يا اسٽيورڊ	150-100 ملي لٽر
	اڳاڻو ساڙ	اسڪور يا ريڊومل گولڊ	250 ملي ليٽر 200 کان گرام 100 لٽر پاڻڙي ۾
	پاڇاڻو ساڙ	ريوس	240 ملي ليٽر 100 ليٽر پاڻڙي ۾ ملائي ڦوهارو ڪڇي
	اڇي ڦڦونڊي	اسڪور يا بائيٽان فوليوئر	50 ملي لٽر لٽر پاڻڙي ۾








<p>250 گرام 100 لتر پاڻي ۾</p>	<p>تاپسن اير يا ريڊومل گولڊ</p>	<p>ڊائونِي ملڊيو</p> 		
<p>200 کان 250 ملي لتر</p>	<p>اميدا يا كونفيڊور</p>	<p>سست مهلو</p> 	<p>پتاتا</p>	
		<p>سائو مهلو</p> 		
<p>200 ملي لتر 100 لتر پاڻي ۾</p>	<p>پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون</p>	<p>پتاتي جو پوپٽ</p> 		
		<p>آمريڪي ڪينٽون</p> 		
<p>100 ملي لتر 100 لتر پاڻي ۾</p>	<p>ميچ يا ڊرون يا اسٽورڊ</p>	<p>چور ڪينٽون</p> 		
		<p>لشڪري ڪينٽون</p> 		







<p>250 ملي لٽر 200 کان 250 گرام 100 لٽر پاڻي ۾</p>	<p>اسڪور يا ريڊومل گولڊ</p>	<p>اڳاڻو ساڙ</p> 	<p>بصر ۽ ٿور</p>
<p>125 گرام 100 لٽر پاڻي ۾</p>	<p>اچي مک ۽ سسٽ مهلي جي حملي کان ضابطو رکو ۽ موسپيلان استعمال ڪريو</p>	<p>پاڇاڻو ساڙ</p>  <p>آلو جي وائرس</p> 	
<p>500 ملي لٽر</p>	<p>ڪيوراڪران يا ڪريڪر</p>	<p>ٿرڙو</p> 	
<p>200 ملي لٽر</p>	<p>اميدا</p>	<p>آمريڪي ڪينٽون</p>  <p>چور ڪينٽون</p> 	







		<p>لشکري کينئون</p> 	
500 گرام	ريڊومل گولڊ يا ڊائٽين اير	<p>بصر جو ساڙ ڊائونِي ملڊيو</p> 	
500 گرام	اينٽراڪول يا ڪاپر آڪسي ڪلورائيڊ يا ڊائٽين	<p>پرپل بلاچ</p> 	
50 ملي لٽر	اسڪور		
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽايمر يا ٽائي ڪون يا ميچ	<p>چور کينئون</p> 	مٽر
		<p>آمريڪي يا لشکري</p> 	

		چڙي وارو ڪينئون 	
30 ملي لٽر 60 ملي لٽر 120 گرام	ٿرائي گارڊ يا پوليٽرن سي يا ريڊينٽ	ليف مائينر 	
250 ملي لٽر	ڪونفيڊور يا اميڊا	اڇي مڪ 	
200 گرام	ٽاپسن اير	اڇي پاڻونڊري	
50 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ٻائيتان فوليسر		
250 ملي لٽر	ڪونفيڊور يا اميڊا يا ڊيلفڪس	سست مهلو 	پالڪ
		اڇي مڪ 	
100 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	پروڪليم. يا ٽائيمر. يا ٽائي ڪون يا ميچ يا ڊرون	چور ڪينئون 	

		<p>لشكري كينئون</p> 	
<p>50 ملي لتر 100 لتر پاڻي ۾</p>	<p>اسڪور يا ڊاءِ فيٽاڪونازول</p>	<p>نشان واري بيماري</p> 	
<p>200 ملي لتر</p>	<p>پروكلير، ٽائيمر، ٽائي ڪون</p>	<p>چور كينئون</p> 	
<p>125 کان 150 ملي لتر 500 ملي ليٽر</p>	<p>ميچ يا ڊرون يا ڊيلٽاميكس يا لارسيين</p>	<p>آمريڪي كينئون</p>  <p>تڏ</p> 	<p>هربو</p>
<p>50 ملي لتر 100 لٽي پاڻي ۾</p>	<p>اسڪور يا ڊاءِ فيٽاڪونازول</p>	<p>نشان واري بيماري</p>	

250 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	ڪونفيڊور	سائو مهلو 	سلاڊ
200 سي سي 24 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	نائٽي پاڻرم يا ايڪٽارا	اڏوهي 	
هڪ لٽر	لارسيين	تڏ 	
		چور ڪينئون 	
100 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر، يا ٽائي ڪون ميچ يا ڊرون	لشڪري ڪينئون 	
50 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاء فينڪونازول	نشان واري بيماري 	
250 ملي لٽر	ڪينفيڊور	سائو مهلو 	ڌاڏا ڦوڏنو
24 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	ايڪٽارا		

هڪ لٽر	لارسيبن	<p>اڏوهي</p> 	
		<p>تڏ</p> 	
100 100 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي گون يا ميچ يا ڊرون	<p>چور ڪينٽون</p> 	
		<p>لشڪري ڪينٽون</p> 	
50 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاءِ فييناڪونازول	<p>نشان واري بيماري</p> 	
250 ملي لٽر 80 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	ڪونفيڊور يا اسيتامپيرڊ يا پليٽر	<p>اچي مک</p> 	گل گوبي، بند گوبي

200 سي سي	كونفيڊور يا نائتي پاڻرم	<p>سائو مهلو</p> 	
100 سي سي 500 سي سي	كونفيڊور يا ايدوانتيج	<p>سست مهلو</p> 	
200 ملي لٽر	پروكلير يا تائيمر يا تائي كون	<p>ڊائيمند بيڪ مات گوبي جو ڪينٽون</p> 	
40 گرام في ٽانڪي	ريڊومل گولڊ	<p>پيجاري جو ساڙ</p>	
80 گرام 200 کان 250 سي سي 100 سي لٽر پاڻي ۾	پلينر يا پولو	<p>سست مهلو</p> 	
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروكلير يا تائيمر يا ميج يا تائي ڪون يا ميج يا ڊرون	<p>چور ڪينٽون</p> 	موري ۶ گوگڙو
		<p>لشڪري ڪينٽون</p> 	

زهرن جي استعمال جو صحيح طريقو:

1. جيڪو به زهر ڦوهارو ڪرڻو هجي ان جي مٿان ڏنل هدايتن کي پڙهي عمل ڪجي.
2. ڦوهاري ڪندڙ کي زهر جي اثر کان بچڻ لاءِ هٿن تي پلاسٽڪ يا ربڙ جا جوارب، اکين تي عينڪ، نڪ تي ماسڪ يا ڪپڙي جي ٻٽ، پيرن ۾ بوٽ ضرور پائڻ گهرجن.
3. ڦوهاري دوران ڪاڻڻ، پيئڻ ۽ سگريٽ چڪڻ جي بلڪل اجازت ناهي. اهڙو ڪوبه عمل ڪرڻ سان ڦوهارو ڪندڙ جي صحت خراب ٿيندي.
4. ڦوهاري ٺاهڻ يا ڦوهاري ڪرڻ واري جاءِ تي ٻارن بچڻ، ٻين ماڻهن، جانورن ۽ ڪڪڙن وغيره کي هرگز اچڻ نه ڏجي.
5. ڦوهاري ڪرڻ کانپوءِ هڪدم ڦوهاري واريون خالي ٿيلهيون، بوتلون يا دٻا وغيره ڪڍ ڪڍي پوري ڇڏڻ ۽ گهر جي ڪنهن به استعمال ۾ نه آڻجڻ.
6. ڦوهاري واري مشين کي وهندڙ پاڻيءَ ۾ هرگز نه ڌوئجي نه ته اهو پاڻي هيٺ جڏهن جانور يا ماڻهو يا پکي پڪڻ پيئندا ته انهن جي صحت خراب ٿيندي.
7. ڦوهاري ڪيل باغ مان گهٽ ۾ گهٽ هفتو ڏهه ڏينهن ميوو نه پئجي ۽ باغ ۾ پوکيل گاهه وغيره نه لٽجي ۽ جيڪڏهن پاڇي پوکيل هجي ته اها به هرگز نه پئڻ گهرجي.
8. تيز هوا هلڻ مهل ڦوهارو هرگز نه ڪجي.
9. ڦوهاري واري اهڙي مشين استعمال ڪجي، جيڪا صحيح هجي.
10. ڦوهاري ڪرڻ جو مناسب وقت صبح يا شام آهي، منجهند جو گهڻي تيز اس ۾ ڦوهارو نه ڪجي.

آءِ سي ٽي زرعي توسيعي مرڪز

ڊائريڪٽوريٽ جنرل زرعي توسيع، زراعت کاتو حڪومت سنڌ

ICT Agricultural Extension Services Center, Directorate General Agriculture Extension, Agriculture,
Supply & Prices Department Government of Sindh, Block-F, Shahbaz Building Hyderabad.

Helpline: +92 3111646111 Email: ictagriextensionsindh@gmail.com

www.ictagrisindh.gov.pk