



جنتر يا دانچو - Sesbania

زمين:

جنتر جو فصل هر قسم جي زمين ۾ پوکيو وڃي ٿو. جنهن ۾ سمر ۽ ڪلر اربون زمينون اچي وڃن ٿيون. جڏهن ته چيڪي ۽ لٽياسِي زمين ۾ به هي فصل پوکي سگهجي ٿو. عام طور هي فصل ڪلراني زمينن ۾ ئي پوکيو ويندو آهي.

زمين جي تياري:

هن فصل جي پوکيءَ لاءِ زمين کي 2 کان 3 سڪيءَ جا هر ڏئي سانهر يا پاتيو گهمائي سنوت ۾ آڻجي. زمين ۾ پتر هجن ته اهي پيچي چڏڻ گهرجن ۽ بعد ۾ پوکي ڪجي.

پوکيءَ جو وقت ۽ طريقو:

هي فصل سنڌ ۾ مارچ کان جولاءِ تائين پوکي سگهجي ٿو. عام طور تي جنتر جي پوک ڇت ذريعي ڪئي وڃي ٿي. جنهن جو بچ بينل پاڻي ۾ هٿ سان ڇت ڪجي.

بچ جو مقدار:

هن فصل لاءِ عام طور تي بچ جو مقدار 12 کان 30 ڪلوگرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. جيڪڏهن جنتر بچ لاءِ پوکجي ته بچ جو مقدار 12 ڪلوگرام ۽ مال جي چاري لاءِ يا سائي پاڻ لاءِ پوکجي ته پوءِ 20 کان 30 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪجي. جڏهن ته بچ جو مقدار زمين جي قسم ۽ آبو جي لحاظ مطابق گهٽائي ۽ وڌائي سگهجي ٿو.

پاڻ ڏيڻ:

عام طور تي هن فصل ۾ پاڻ استعمال نٿو ڪيو وڃي. ڇاڪاڻ ته جنتر ۾ نائٽروجن جي جمع ڪرڻ واري صلاحيت وڌيڪ آهي.

پاڻي ڏيڻ:

جنتر جي پوک ڇت ذريعي بينل پاڻيءَ ۾ ڪئي وڃي ٿي. هن فصل کي پوکيءَ بعد پهريون پاڻي 30 ڏينهن بعد ڏنو وڃي ۽ باقي ٻيا رهيل پاڻي 15 ڏينهن جي وقفي بعد ڏجن. گندگاه جون پاڙئون هٿ سان ڪڍجن.

پيداوار:

هن فصل مان سائو گاهه 350 مٺ في ايڪڙ ۽ بچ 12 مٺ في ايڪڙ ملي ٿو.

آءِ سي ٽي زرعي توسيعي مرڪز

ڊائريڪٽوريٽ جنرل زرعي توسيع، زراعت کاتو حڪومت سنڌ

ICT Agricultural Extension Services Center, Directorate General Agriculture Extension, Agriculture, Supply & Prices Department Government of Sindh, Block-F, Shahbaz Building Hyderabad.

Helpline: +92 3111646111 Email: ictagriextensionsindh@gmail.com

www.ictagrisindh.gov.pk